

៣. ការអង្កេតតាមដាន

ការបំផ្លាញមានសកម្មភាពខ្លាំងចាប់ពីពេលម្រេចចេញផ្កាទៅ រហូតដល់ដំណាក់កាលម្រេចចេញក្តីប។ ការអង្កេតវត្តមានស្រឹងប៉ាវចិន ត្រូវពិនិត្យនៅលើផ្កា ឬកូរម្រេចខ្លីៗ នៅពេលព្រឹកព្រលឹម។ ដំណាក់កាលកូន និងពេញវ័យនៃស្រឹងប៉ាវចិន គឺជាដំណាក់កាលដែលបំផ្លាញដំណាំម្រេចខ្លាំង។

ផ្កាម្រេចដែលរងការបំផ្លាញដោយស្រឹងប៉ាវចិន នឹងប្រែពណ៌ពីត្នោតទៅខ្មៅ ត្រង់ចំណុចដែលស្រឹងប៉ាវចិនជញ្ជក់។ ផ្កា ឬក្តីបដែលរងការបំផ្លាញនឹងប្រែជាស្រពោន មានពណ៌ប្រផេះ រួចជ្រុះនៅពេលមានការបំផ្លាញខ្លាំងក្លា។



ស្រឹងប៉ាវចិន លើទងផ្កាម្រេច



ពីងពាងចាប់ស្រឹងប៉ាវចិន

៤. វិធានការគ្រប់គ្រង និងកម្ចាត់

- ✳ ថែរក្សាពពួកសត្វសរីរាង្គមានប្រយោជន៍ដែលស៊ីចែកប៉ាល់ហោះ ដូចជាកន្ទុយ ពពួកពីងពាង សត្វកន្ទុយពីរ កណ្តុបបុកស្រូវក៏ដូចជាសត្វបង្កួយជីងចក់ជាដើម។
- ✳ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ និងដោយយកចិត្តទុកដាក់ អំពីវត្តមាន និងប្រជាកររបស់ចែកប៉ាល់ហោះ នៅក្នុងរដូវដែលមានការបំផ្លាញខ្លាំង គឺចាប់ពីម្រេចចេញផ្ការហូតដល់ម្រេចដាក់គ្រាប់ ដោយការសង្កេតគួរធ្វើនៅពេលព្រឹកព្រលឹម។
- ✳ ចាប់ដោយដៃ និងកម្ទេចសត្វពេញវ័យ និងកូនចែកប៉ាល់ហោះពីផ្កា និងពីផ្លែម្រេច នៅពេលដែលសត្វល្អិតមានចំនួនតិចនៅឡើយ។
- ✳ ប្រើថ្នាំពុលផ្សំពីរុក្ខជាតិ មានថ្នាំខ្លាំង ២-៥គីឡូក្រាម មើមក្នុង ៣-៥គីឡូក្រាម និងល្វាសៀម ២-៥គីឡូក្រាម ដោយត្រាំជាមួយទឹក ៦០លីត្រ រយៈពេល ៥-១០ថ្ងៃ ទើបយកទៅបាញ់លើចែកប៉ាល់ហោះ។
- ✳ ក្នុងករណីប្រើថ្នាំពុលផ្សំពីរុក្ខជាតិមិនមានប្រសិទ្ធភាព អាចប្រើថ្នាំអាសេហ្វាត (Acephate)^១ ឈ្មោះលក់នៅទីផ្សារ មោនស្ទ័រ (Monster) ក្នុងកម្រិត ១៥ម.ល^២ លាយទឹក ១០លីត្រ (អាចប្រមូលផល ក្រោយពេលបាញ់បាន ១០-១៥ថ្ងៃ) ឬប្រើថ្នាំប៊ុយប្រូហ្វេស៊ីន (Buprofezin)^៣ ឈ្មោះលក់លើទីផ្សារ ប៊ុយទីល និងអាប៊ីផ្លូដី (Butyl 10WP and Applaud 10WP) ក្នុងកម្រិត ២០ក្រាម លាយទឹក ៨លីត្រ (អាចប្រមូលផលបានក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំ ៧ថ្ងៃ) ឬប្រើថ្នាំឌីណូតេហ្វុយរ៉ាន (Dinotefuran)^៤ ឈ្មោះលក់លើទីផ្សារ អូស៊ីន (OSHIN 20WP) ក្នុងកម្រិត ១កញ្ចប់តូច ៦,៥ក្រាម លាយទឹក ១៦លីត្រ (អាចប្រមូលផលក្រោយពេលបាញ់បាន ៧ថ្ងៃ)។



១ ថ្នាំពុលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ (ចំណាត់ថ្នាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោក)
 ២ មួយមីល្លីលីត្រ = មួយសេសេ
 ៣ ថ្នាំពុលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី៤ (Un) (ចំណាត់ថ្នាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោក)
 ៤ ថ្នាំពុលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ (ចំណាត់ថ្នាក់យោងតាមព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន EPA សហរដ្ឋអាមេរិក)